Table 2 Effect of herbicides on plant height at different time interval on direct seeded rice cultivation at Chitwan during 2024

Treatments	Plant height (cm)					
	30 DAS	45 DAS	60 DAS	75 DAS	90 DAS	at Harvest
Weedy Check	44.7^{d}	52.9^{d}	65.1^{c}	81.0^{c}	85.9^{c}	87.4^{c}
Weedfree	49.5^{ab}	66.6^{a}	75.3^{a}	91.3^{a}	93.2^{a}	93.4^{a}
Pendimethalin	45.3^{cd}	66.1^{a}	71.7^{b}	81.8^{c}	86.4^{c}	91.1^{b}
Pretilachlor	46.0^{bcd}	64.8^{ab}	72.1^{b}	88.5^{b}	91.4^{ab}	92.2^{a}
Bispyribac sodium	45.7^{cd}	60.7^{c}	73.0^{b}	89.0^{b}	90.8^{b}	92.9^{a}
Pendi+2,4-D	43.5^{d}	61.6^{c}	70.5^{b}	86.4^{b}	90.7^{b}	91.5^{b}
Pretilachlor+2,4-D	40.5^{e}	60.6^{c}	71.5^{b}	88.1^{b}	91.5^{ab}	92.5^{a}
Oxadiargyl	48.3^{bc}	68.8^{a}	74.0^{a}	93.0^{a}	95.1^{a}	93.0^{a}
Bispyribac Sodium+ 2,4-D	50.5^{a}	73.5^{a}	76.5^{a}	94.0^{a}	95.7^{a}	93.4^{a}
SEm±	0.97	1.85	1.03	1.42	1.06	0.59
CV%	6.34	8.67	4.28	4.83	3.49	1.93
Mean	46.00	63.96	72.19	88.12	91.19	91.93

Note: DAS= Days after sowing, SEm = Standard error of mean and CV= Coefficient of variation