Table 4 Effect of herbicides on CGR at different time interval on direct seeded rice cultivation at Chitwan during 2024

Treatments	Crop growth rate ($g/m^2/day$)			
	30-45 DAS	45-60 DAS	60-75 DAS	75-90 DAS
Weedy Check	2.22^{c}	10.6^{c}	48.0^{c}	25.1^{c}
Weedfree	3.12^{ab}	22.3^{ab}	74.3^{a}	40.7^{b}
Pendimethalin	2.62^{bc}	20.1^{b}	62.4^{b}	36.8^{b}
Pretilachlor	3.02^{ab}	20.1^{b}	70.3^{ab}	37.5^{b}
Bispyribac sodium	2.32^{c}	21.6^{ab}	75.6^{a}	50.9^{a}
Pendi+2,4-D	2.22^{c}	17.15^{b}	60.6^{b}	29.6^{c}
Pretilachlor+2,4-D	1.72^{d}	17.0^{b}	66.9^{ab}	36.6^{b}
Oxadiargyl	3.02^{ab}	19.2^{b}	70.4^{ab}	38.7^{b}
Bispyribac Sodium+ 2,4-D	3.40^{a}	22.8^{a}	72.7^{a}	52.0^{a}
SEm±	0.18	1.25	2.90	2.90
CV%	20.82	19.76	13.02	22.53
Mean	2.63	18.98	66.80	38.66

Note: Treatment means followed by the same letter (s) within the column are non-significantly different among each other at 5% level of significance. DAS= Days after sowing, SEm = Standard error of mean and CV= Coefficient of variation